

Sífilis

“pox” o “sif”

La sífilis es una enfermedad muy grave. El contacto con las llagas de una persona infectada durante la relación sexual es la principal forma de transmisión de una persona a otra. También se puede transmitir de una mujer embarazada a su bebé.

Indicios y síntomas

La sífilis es una enfermedad complicada y grave y los síntomas varían durante las diferentes etapas de la enfermedad.

Primera etapa

Aproximadamente 3 semanas después de la relación sexual, aparece una única llaga indolora denominada chancro. Generalmente, aparece en el pene, el ano, el cuello uterino o la boca, pero puede aparecer en cualquier parte. El chancro puede parecer una llaga de otra enfermedad, incluyendo otras ETS. Con la sífilis sólo aparece una llaga. No duele y por lo general es dura en los bordes. La llaga es muy contagiosa, esto significa que puede transmitir sífilis a otras personas.

Segunda etapa

Si la sífilis no se trata durante la primera etapa, pasa a la segunda etapa. En 6 ó 7 semanas, las personas infectadas desarrollan un sarpullido en las palmas de las manos, plantas de los pies y otras partes del cuerpo. Este sarpullido es contagioso. Es probable que se sienta engripado. Estos síntomas desaparecen en 2 semanas aproximadamente, pero si no se tratan, su cerebro, corazón y otros órganos pueden comenzar a sufrir serios daños.

Tercera etapa o etapa latente

No hay síntomas y usted no contagia en la tercera etapa. El daño oculto empeora hasta el tratamiento o la muerte.

Examen

Se realiza un análisis de sangre para detectar los gérmenes en forma de espiral (espiroquete) que causan la sífilis. Las llagas también pueden ser examinadas. Si ha tenido relaciones sexuales con una persona con sífilis, debe ser examinado y tratado de inmediato. Es posible que los exámenes se realicen más de una vez.

Tratamiento

Se aplica una inyección de penicilina especial que elimina los gérmenes. Se puede aplicar en cualquier etapa y previene mayores daños. Puede volver a contraer sífilis si tiene relaciones sexuales con una persona infectada.

A las mujeres embarazadas se les realiza el examen de sífilis durante la atención prenatal. La madre y el bebé pueden ser tratados y curados durante el embarazo.

Prevención

- **Conozca a sus parejas**—vaya con ellas a las evaluaciones de las ETS.
- **Use preservativos correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales.**
- **Tenga menos parejas.** Mientras más parejas tenga, mayor será su riesgo de contraer sífilis.
- **Las pastillas para el control de la natalidad no previenen la infección.**

Aprenda más acerca de la sífilis

Si tiene preguntas o necesita más información, póngase en contacto con su médico, departamento de salud local, clínica comunitaria o llame a la Línea Directa Nacional sobre ETS al **1-800-227-8922**.

Este documento se encuentra disponible en otros formatos para personas con discapacidades a solicitud del interesado. Para presentar una solicitud, llame al 1-800-525-0127 (TTY/TDD 1-800-833-6388).



Dear Colleague,

The Washington State Department of Health (DOH) provides print-ready files (PDFs) of health education materials. To ensure that the original quality of the piece is maintained, please read and follow the instructions below and the specifications included for professional printing.

- **Use the latest version.** DOH materials are developed using the most current information available, are checked for clinical accuracy, and are field tested with the intended audience to ensure they are clear and readable. DOH programs make periodic revisions to educational materials, so please check this web site to be sure you have the latest version. DOH assumes no responsibility for the use of this material or for any errors or omissions.
- **Do not alter.** We are providing this artwork with the understanding that it will be printed without alterations and copies will be free to the public. Do not edit the text or use illustrations or photographs for other purposes without first contacting us. Please do not alter or remove the DOH logo, publication number or revision date. If you want to use a part of this publication for other purposes, contact the Office of Health Promotion first.
- **For quality reproduction:** Low resolution PDF files are intended for black and white or color desktop printers. They work best if you are making only one or two copies. High resolution PDF files are intended for reproducing large quantities and are set up for use by professional offset print shops. The high resolution files also include detailed printing specifications. Please match them as closely as possible and insist on the best possible quality for all reproductions.

If you have questions, contact:
Office of Health Promotion
P.O. Box 47833 Olympia, WA 98504-7833
(360) 236-3736

Sincerely,
Health Education Resource Exchange Web Team

P R I N T I N G S P E C I F I C A T I O N S

Title: Syphilis (card)

Size: 3.66 x 8.5"

Paper stock: Cougar 65# cover, white, smooth

Ink color: PMS 307

Special instructions: 2-sided printing

DOH Pub #: 347-025